

## MODILAC ACTIGEST 1

**Dijetetski proizvod – hrana za posebne medicinske namjene**  
**Početna formula za dojenčad sa vraćanjem (regurgitacijom) hrane**  
Od 0-6 meseci

**Neto količina:** 800 g

**MODILAC ACTIGEST 1** je početna formula prilagođena za potrebe ishrane dojenčadi sa vraćanjem (regurgitacijom) hrane, od rođenja do 6. meseci. Sadrži lako svarljiv kukuruzni škrob koji zgušnjava formulu i smanjuje regurgitaciju (bljuckanje).

- Sa dodatkom DHA<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> u skladu sa zahtevima za početne formule za dojenčad
- Bez glutena

Proizvod sadrži i mliječno-kiselinske bakterije (*Bifidobacterium infantis*)

### Uputstvo za pripremu

Potrebe dojenčadi su individualne, i zavise od tjelesne mase a ne od starosti dojenčeta. Preporučene količine i broj obroka u toku dana u tabeli su prosječne dnevne količine. Prije upotrebe proizvoda konsultovati se sa pedijatrom.

Jedna mjerna kašika (4,5 g praha) na svakih 30 ml vode.

|   |                            |     |     |     |     |     |     |
|---|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Prosječna tjelesna masa dojenčeta (kg)</b> | 3,3                        | 4,2 | 5   | 5,6 | 6,3 | 6,9 |     |
| <b>Uzrast dojenčeta (mjeseci)</b>             | 0-1                        | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 |     |
| <b>Priprema obroka</b>                        | <b>Voda (ml)</b>           | 90  | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
|   | <b>Broj mjernih kašika</b> | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
| <b>Broj obroka u toku dana</b>                | 6                          | 6   | 5   | 5   | 4   | 4   |     |

Zbog zdravlja Vaše bebe, uvijek se pažljivo pridržavajte uputstva za upotrebu. Nepravilna upotreba ili priprema mogu ugroziti zdravlje Vaše bebe. Uvijek operite ruke prije pripreme obroka. Obrok pripremiti neposredno prije upotrebe. Pripremljen obrok treba upotrijebiti u roku od jednog sata. Nikada ne koristite ponovo neiskorišćene ostatke obroka.

1. Flašice, dijelove flašica i cucle temeljno oprati. Potrebnu količinu vode sipati u čistu flašicu. Koristiti flaširanu vodu sa niskim sadržajem minerala. Voda se može prethodno zagrijati na maksimalno 40° C prije dodavanja praha. Ukoliko koristite prokuvanu vodu prilikom pripreme obroka ohladite je na 40°C.

2. Priloženu mjernu kašiku napuniti prahom i izravnati.

3. Dodati tačan broj mjernih kašika praha u flašicu sa vodom poštujući uputstvo za pripremu: 1 mjerna kašika na svakih 30 ml vode.

4. Zatvoriti flašicu i snažno promućkati. Provjeriti temperaturu obroka sipanjem nekoliko kapi na unutrašnju stranu zgloba.

### **Važne napomene**

Koristiti samo pod medicinskim nadzorom.

Majčino mlijeko je najbolja hrana za vašu bebu.

**MODILAC ACTIGEST 1** je pogodan za upotrebu kao jedini izvor hrane za dojenčad od rođenja do 6. meseci.

Ne koristiti **MODILAC ACTIGEST 1** u slučaju alergije na proteine kravljeg mlijeka, galaktozemije i laktozne intolerancije.

Nije za parenteralnu upotrebu.

**MODILAC ACTIGEST 1** može zahtijevati izbor odgovarajuće cucle.