

MODILAC DOUCÉA 2

Dijetetski proizvod

Mlijeko nakon dojenja

Od 6-12 mjeseci

Neto količina: 800 g

MODILAC DOUCÉA 2 je mlijeko nakon dojenja, formulisano za posebnu dijetetsku namjenu za dojenčad stariju od 6 mjeseci

Sa dodatkom:

- Laktoferina dobijenog iz kravljeg mlijeka
- DHA¹
- Vitamini A, C i D¹

Bez palminog ulja

Bez glutena

¹ u skladu sa zahtjevima za mlijeka nakon dojenja

Prozvod sadrži i laktoferin dobijen iz kravljeg mlijeka, prebiotike frukto-oligosaharide (FOS) i galakto-oligosaharide (GOS), mliječno-kiselinske bakterije (*Bifidobacterium infantis*)

Uputstvo za pripremu

Preporučene količine i broj obroka u toku dana u tabeli su prosječne dnevne količine. Prije upotrebe proizvoda konsultovati se sa pedijatrom.

Jedna mjerna kašika (**4,8 g** praha) na svakih **30 ml** vode.

Prosječna tjelesna masa dojenčeta (kg)	≥ 7	
Uzrast dojenčeta (mjeseci)	≥ 6	
Priprema obroka	Voda (ml)	240
	Broj mjernih kašika	8
Broj obroka u toku dana	2-3	

Zbog zdravlja Vaše bebe, uvijek se pažljivo pridržavajte uputstva za upotrebu. Nepravilna upotreba ili priprema mogu ugroziti zdravlje Vaše bebe. Uvijek operite ruke prije pripreme obroka. Obrok pripremiti neposredno prije upotrebe. Pripremljen obrok treba upotrijebiti u roku od jednog sata. Nikada ne koristite ponovo neiskorišćene ostatke obroka.

1. Flašice, delove/ dijelove flašica i cucle temeljno oprati. Potrebnu količinu vode sipati u čistu flašicu. Koristiti flaširanu vodu sa niskim sadržajem minerala. Voda se može prethodno

zagrijati/ zagrijati na maksimalno 40°C pre/ prije dodavanja praha. Ukoliko koristite prokuvanu vodu prilikom pripreme obroka ohladite je na 40°C.

2. Priloženu kašiku za mjerenje napuniti prahom i izravnati.

3. Dodati tačan broj kašika za mjerenje u flašicu sa vodom poštujući uputstvo za pripremu: 1 kašika za mjerenje na svakih 30 ml vode.

4. Zatvoriti flašicu i snažno promućkati. Provjeriti temperaturu obroka sipanjem nekoliko kapi na unutrašnju stranu zgloba.

Važne napomene

MODILAC DOUCÉA 2 se ne može koristiti kao zamjena za majčino mlijeko u prvih šest mjeseci života. Dojenje treba nastaviti i poslije navršenih 6 mjeseci života do kraja druge godine starosti djeteta. Uz majčino mlijeko postepeno treba početi uvoditi namirnice koje se uobičajeno koriste u porodičnoj ishrani. **MODILAC DOUCÉA 2** može da predstavlja dio raznovrsne ishrane. Odluka o započinjanju dopunske ishrane, uključujući i odluku o započinjanju dopunske ishrane i prije šest mjeseci starosti, može biti donijeta samo na osnovu savjeta zdravstvenih radnika nezavisnih od proizvođača hrane, a na bazi individualnih posebnih potreba za rast i razvoj dojenčeta.